



برنامه جهانی ریشه کنی طاعون نشخوار کنندگان کوچک (PPR)



اگر مشکوک به بیماری PPR هستید ، در اسرع وقت با دامپزشکی محل تماس بگیرید.

تشخیص بیماری		BE AWARE	علائم بالینی
			سرفه
			افسردگی
ترشح از چشم ها ، بینی و دهان ، در ابتدا رقیق و شفاف ، تبدیل به غلیظ و زرد رنگ می شود.		گوسفند و بز مبتلا می شوند	اسهال
زخم در دهان و حیوان غذا نمی خورد.		مرگ ناگهانی بخصوص در بز	سختی در تنفس
بیماری چگونه منتشر می شود			
مهمترین راه انتقال از طریق تماس مستقیم با حیوان و استنشاق است. این ویروس در ترشحات بینی و چشم ، ادرار و مدفوع وجود دارد.		تماس مستقیم با حیوانات	
انتقال مکانیکی ذرات ویروس بر روی اجسام بی جان مانند کفش ، لباس ، وسایل دامپزشکی یا وسایل نقلیه است. با این حال ، ویروس به مدت طولانی در محیط باقی نمی ماند.		انتقال مکانیکی	
انسان به بیماری مبتلا نمی شود ، اما می توانند نقش مهمی در گسترش آن ایفا کنند. اماکنی مانند بازارها و میادین دام می توانند بیماری را گسترش دهند.		نقش افراد	

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان سمنان

مهر - ۱۴۰۰