



سازمان دامپزشکی کشور

اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

بیماری هاری و راه‌های پیشگیری از آن



آموزش و ترویج اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

۱۴۰۱

چگونه از زخمی و گزیده شدن

پیشگیری شود؟

- * با کنترل سگ‌های بدون صاحب
- * با آموزش کودکان که هرگز به حیوانات وحشی نزدیک نشوند.
- * با خودداری از نزدیک شدن به سگ‌ها در حین تغذیه و یا در زمانی که توله دارند.
- * با پرهیز از دویدن و تحریک کردن سگ‌ها.



روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

تلفن تماس ۳۳۳۶۸۱۰۸ دورنگار: ۳۳۳۶۶۵۷۲

آدرس اکترونیکی: ivokhuzestan@ivo.ir

آدرس سایت: <https://khuzestan.ivo.ir>

مقدمه:

هاری بیماری خطرناک ویروسی ولی قابل پیشگیری است که اغلب از طریق گازگرفتگی توسط یک حیوان هار منتقل می‌شود. هاری بر سیستم اعصاب مرکزی پستانداران اثر می‌گذارد و در نهایت باعث عارضه در مغز و مرگ می‌شود.

چه حیواناتی دچار هاری می‌شوند؟

تمام پستانداران ممکن است به هاری مبتلا شوند و بیماری را به یکدیگر منتقل کنند.

هاری چگونه منتقل می‌شود؟

- * گازگرفتگی، چنگ زدن و خراش دادن توسط حیوان هار
- * استنشاق ویروس خصوصاً در آزمایشگاه‌های تولید واکسن



بیماری چگونه ایجاد می‌شود؟

بعد از گزش فرد یا حیوان توسط یک حیوان هار، ویروس از طریق بزاق وارد بدن شده، از راه اعصاب محیطی به نخاع و در نهایت به مغز می‌رسد و علائم هاری بعد از ۳ تا ۱۲ هفته بروز می‌کند.

نشانه‌های بیماری در حیوانات چیست؟

* هرگونه رفتار غیرطبیعی در دام (ترس از آب یا ترس از نور)

* آبریزش از دهان

* گوشه‌گیری حیوانات خشن مانند سگ‌های گله

* رام شدن غیرطبیعی و نزدیکی به افراد، خصوصاً گربه‌ها



چه حیواناتی ویروس هاری را منتقل

می‌کنند؟

گفته شده است که هر پستانداری ممکن است به هاری مبتلا شود. رایج‌ترین مخازن وحشی هاری، راکون‌ها، راسوها، خفاش‌ها و روباه‌ها هستند. در ایران گرگ نیز مخزن هاری است؛ همچنین پستانداران خانگی ممکن است به هاری مبتلا شوند. در جهان، بیشترین گزارش هاری در حیوانات اهلی و خانگی، مربوط به گاوها، گربه‌ها و سگ‌هاست.

راه‌های پیشگیری از بیماری هاری در

انسان چیست؟



* واکسیناسیون افراد بعد از گزیده شدن توسط حیوانات

* واکسیناسیون افراد پرخطر قبل از گزش و در صورت مسافرت به کشورهای با آلودگی بالا

* واکسیناسیون حیوانات خانگی

پیشگیری پس از مواجهه با هاری

به محض زخمی یا گزیده شدن توسط حیوان، لازم است محل زخم را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب و صابون بشوید. در صورتی که زخم خونریزی ندارد، از پانسمان آن خودداری کنید. تا حد امکان، حیوان گزنده به مدت ده روز در یک محل بسته شود و تغییرات رفتاری آن مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت بروز رفتارهای ناشی از بیماری هاری در حیوان، تدابیر لازم از جمله معدوم سازی حیوان و دریافت دوزهای کامل واکسن از سوی فرد مجروح صورت پذیرد. برای دریافت واکسن باید فوری به مراکز درمانی مراجعه شود. افرادی که اولین بار مورد گزش قرار گرفته‌اند لازم است سرم ایمونوگلوبولین هاری و واکسن هاری را در روزهای صفر، ۳، ۷، ۱۴ و ۲۸ دریافت کنند. در صورتی که فرد قبلاً واکسن هاری را دریافت کرده باشد نیازی به سرم ایمونوگلوبولین ندارد و تنها دریافت واکسن هاری کافی است.