



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

اهمیت و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند در استان همدان



مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش و منابع طبیعی
استان همدان
۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحيم



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

اهمیت و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند در استان همدان

نویسندگان:

سمیه اله ویسی، مهدی حسنی و

محمد جواد ارده

سال ۱۴۰۱

سرشناسه	: الهویسی، سمیه، ۱۳۶۲-
عنوان و نام پدیدآور	: اهمیت و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند در استان همدان/ نویسندگان سمیه الهویسی، مهدی حسنی و محمدجواد ارده؛ سرویراستار نصیبه پورفاتح؛ تهیه شده در معاونت آموزش و ترویج کشاورزی.
مشخصات نشر	: تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهری	: ۲۲ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۹-۹۴-۰
وضعیت فهرست نویسی	: فیا
یادداشت	: کتابنامه.
موضوع	: چغندر قند -- ایران -- بیماری‌ها و آفت‌ها Sugar beet -- Iran -- Diseases and pests سوسک‌ها -- کنترل Beetles -- Control
شناسه افزوده	: ارده، محمدجواد، ۱۳۴۵-
شناسه افزوده	: حسنی، مهدی، ۱۳۵۳- شهرپور-
شناسه افزوده	: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی
شناسه افزوده	: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی.
رده بندی کنگره	: SB۲۲۰
رده بندی دیویی	: ۶۳۳/۶۳۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۸۸۵۹۸۹۱
اطلاعات رکورد کتابشناسی	: فیا

ISBN: 978-622-7949-94-0

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۹-۹۴-۰



نشر آموزش کشاورزی

عنوان: اهمیت و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند در استان همدان

نویسندگان: سمیه اله ویسی، مهدی حسنی و محمد جواد ارده

مدیر داخلی: ویدا همتی

سرویراستار: نصیبه پورفاتح

ویراستار ترویجی: سعیده اجاقی

تهیه شده در: معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی

صفحه آرا: سبا سادات کرمانی پوربقایی

شمارگان: محدود

نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۱

مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی ۶۱۶۲۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ است.

نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، پلاک ۲۰۵، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی

تلفن: ۶۶۴۳۰۴۶۵ | تلفکس: ۶۶۴۳۰۴۶۴ | کد پستی: ۱۴۵۷۸۹۶۶۸۱

مخاطبان

- ♦ کشاورزان
- ♦ کارشناسان
- ♦ مروجان پهنه های تولیدی

اهداف آموزشی

- ♦ شما پس از مطالعه این نشریه با شناسایی، خسارت و روش کنترل سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند آشنا می شوید.

فهرست

صفحه

عنوان

۹	مقدمه
۱۰	اهمیت تغییر اقلیم
۱۲	مشخصات شکل شناسی آفت
۱۴	علایم خسارت آفت
۱۶	زیست شناسی آفت
۱۸	مدیریت آفت
۲۰	خلاصه مطالب

مقدمه

چغندر قند مهم ترین منبع تولید شکر و یکی از محصولات راهبردی برای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت غذایی است. کشاورزان با افزایش تولید باکیفیت این محصول، موجب دستیابی به خودکفایی در تولید شکر شده اند. تولید این محصول همواره با چالش های فراوان روبه رو است، به طوری که نحوه فعالیت و مدیریت یک کشاورز چغندرکار از زمان تصمیم به کاشت تا زمان برداشت محصول، در کاهش یا افزایش عملکرد کمی (ریشه) و عملکرد کیفی (عیار قند) موثر است. همچنین با تغییرات ایجاد شده در شرایط اقلیمی و دمایی کشور طی سال های اخیر، روند ظهور و افزایش جمعیت آفات و به دنبال آن خسارت وارده به این محصول، بسیار متفاوت تر از گذشته است. یکی از آفات چغندر قند که به ویژه در دو سال اخیر، ظهور جمعیت بالایی داشته، سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند است؛ این آفت در تمام چغندرکاری های کشور خسارت می زند. با توجه به شدت خسارت این آفت از اواسط اردیبهشت ماه تا اوایل مرداد ماه در استان همدان، به نظر می رسد که وضعیت این آفت از درجه دو به درجه یک برسد. از این رو، کشاورزان برای مدیریت جمعیت و خسارت آفت، باید از روش های مناسب استفاده کنند.

اهمیت تغییر اقلیم

ایران در طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴، میانگین افزایش دما بین ۱ تا ۲ درجه سانتی گراد را تجربه کرده است. این نوسانات موجب ایجاد تغییرات در ترکیبات شیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه میزبان می شود. تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش دی اکسید کربن و در پی آن افزایش درجه حرارت، ممکن است سبب تغییر جمعیت و فعالیت آفات شود. فعالیت و خسارت آفات می تواند حتی بر پدیده های شکارگری و پارازیتیزی عوامل مهارکننده آن ها تاثیر بگذارد. از دیگر آثار منفی تغییر اقلیم بر افزایش جمعیت آفات عبارت اند از:

- ◆ تغییر در گسترش جغرافیایی
- ◆ نوسان زمان زمستان گذرانی
- ◆ تغییر در سرعت رشد طغیانی شدن جمعیت
- ◆ جایگزینی میزبان های گیاهی
- ◆ افزایش تعداد نسل
- ◆ تغییر در هم زمانی آفت و میزبان گیاهی

استان همدان با زمین های مستعد برای کشت چغندر قند، در جایگاه هفتم کشور از نظر سطح زیر کشت این محصول است. سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی ۹۸-۹۹، حدود ۶/۵ هزار هکتار بوده است (مطابق با آمار بخش تحقیقات چغندر قند استان همدان) که نسبت به سال ۹۷-۹۸ (۶/۲ هزار هکتار) افزایش نشان می دهد. چغندر قند از همان مراحل نخست رویش، (۲ تا ۸ برگ) به شدت به آفات حساس است و هرگونه خسارت آفات در این دوره، می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر شود؛ بنابراین، مهار آفات در این دوران، سبب افزایش چشمگیر عملکرد و بالا رفتن عیار قند خواهد شد. بدین ترتیب، نظر به تاثیر تغییرات ایجاد شده در شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور که مهم ترین

آن‌ها افزایش دما و کاهش بارندگی بوده است، روند ظهور و رشد جمعیت برخی از آفات و در پی آن، خسارت وارده به محصولات با سال‌های قبل تفاوت داشته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.

ظهور و خسارت سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند در دو سال اخیر، تفاوت بسیاری با سال‌های گذشته دارد. ویژگی‌های این آفت از این قرار است:

✓ این آفت با اسامی محلی سنگ برداری در اصفهان، خزوک در شیراز و سنگ بردار در کرمان، یکی از آفات مهم ایجاد خسارت روی چغندر قند است.

✓ با توجه به افزایش تقریبی دو درجه سانتی گراد میانگین دمای هوا در سال‌های زراعی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ و ۱۳۹۹-۱۴۰۰، نسبت به متوسط دمای سال‌های گذشته در فصل رویش این محصول، این آفت طی مرحله ۶-۲ برگی بوته‌های چغندر قند در بیشتر چغندر کاری‌ها ظاهر شده و با تغذیه از برگ‌ها خسارت زیادی زده است.

✓ بنا بر گزارش‌های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، تا سال‌های اخیر جمعیت این آفت زیر آستانه زیان اقتصادی بوده و نیاز به مدیریت جداگانه‌ای نداشته است.

✓ به تدریج با افزایش جمعیت و خسارت این آفت در مزارع چغندر قند، کشاورزان مجبور به سم‌پاشی با حشره کش‌های رایج برای مهار آن شدند.

✓ حشره کش‌های مختلفی از جمله دسیس، اکامت و پرمترین، برای مدیریت این آفت در منطقه به کار می‌رود، اما از آنجا که این آفت در سال‌های گذشته خسارت کمی داشت، آفت کش‌های زیادی برای مهار آن معرفی نشده‌اند.

✓ با توجه به افزایش دمای هوا و نیز افزایش سطح زیر کشت چغندر کاری در کشور، و احتمال طغیان این آفت در سال‌های آینده با گرم‌تر شدن هوا، معرفی حشره کش‌های مناسب و اختصاصی‌تر برای مدیریت این خسارت ضروری به نظر می‌رسد.

مشخصات شکل شناسی آفت


آفت خرطوم کوتاه چغندر قند که در بین کشاورزان به خال سیاه معروف است، مشخصاتی به شرح زیر دارد:

طول بدن حشره کامل خرطوم کوتاه چغندر قند حدود ۱۰ الی ۱۶ میلی متر با رنگ عمومی خاکی است و پوشیده از پرزهای قهوه ای مایل به خاکستری رنگ است (شکل ۱ الف). در محل اتصال سینه به شکم خرطوم کوتاه، خال های کوچک سفیدرنگی دیده می شود.

تخم ها بیضی شکل و زردرنگ هستند و حدود یک میلی متر طول دارند (شکل ۱ ب) و در زیر پولک سیاه رنگی قرار داده می شوند؛ به همین سبب، به این آفت "خال سیاه" گفته می شود (شکل ۲).



شکل ۱- الف) حشره کامل خرطوم کوتاه چغندر قند ، ب) ایجاد خال سیاه در انتهای ساقه در نسل دوم ظهور آفت



شکل ۲- محل تخم‌ریزی خرطوم کوتاه چغندر قند روی گیاه (اصلی) الف) خسارت شدید و ایجاد خال سیاه روی برگ‌ها در مرحله دوبرگی، ب) داسی شدن برگ بر اثر تغذیه حشره کامل خرطوم کوتاه

لاروهای آفت قوسی شکل، بدون پا، به رنگ سفید و با سر قهوه‌ای تا زرد روشن هستند که اندازه کامل آنها به حدود ۱۵ میلی‌متر می‌رسد (شکل ۳). شفیره‌ها سفیدرنگ و به طول حدود ۱۵ میلی‌متر هستند که شباهت زیادی به حشره کامل دارند و درون گهواره‌های بیضی شکل گلی در داخل خاک نزدیک بوته‌های چغندر تشکیل می‌شوند (شکل ۴).



شکل ۳- لارو خرطوم کوتاه چغندر قند



شکل ۴- شفیره خرطوم کوتاه چغندرقد

علامه خسارت آفت

خسارت آفت علایمی به شرح زیر دارد:

✓ حشرات کامل این آفت در بهار به محض سبز شدن چغندرقد ظاهر می شوند و از دو برگ اولیه بوته چغندر که تازه سبز شده و سر از خاک بیرون آورده است، تغذیه می کنند.

✓ حشرات کامل سرخرطومی پس از استقرار روی بوته های جوان چغندر، از یک طرف شروع به تغذیه از برگ می کنند، به طوری که برگ به شکل داس در می آید (شکل ۵).

✓ جمعیت این آفت در ابتدای فصل بسیار زیاد است و در دو مرحله زیستی لارو و حشره کامل، با تغذیه از برگ های جوان و ریشه های تازه تشکیل شده، گاهی سبب نابودی بوته های جوان می شود و کشاورزان را مجبور به واکاری می کند.

✓ لاروهای کوچک زردرنگ پس از خارج شدن از تخم، قسمت زیرین برگ را می روند و سپس روی زمین می افتند و به تدریج درون خاک به طرف ریشه چغندر می روند و تغذیه از ریشه را آغاز می کنند.

✓ خسارت این آفت سبب پژمردگی، زرد شدن و سپس خشکیدگی بوته می شود (شکل ۶).

✓ تغذیه هر لارو می تواند سبب از بین رفتن یک بوته جوان شود.

✓ در حالت طغیانی، تا ۱۴ عدد لارو هم روی یک بوته دیده شده است.

✓ البته لاروهای این آفت درون خاک تحرک ندارند و نمی توانند از ریشه ای به ریشه دیگر بروند و فقط همان ریشه هدف را از بین می برند.



شکل ۵- خسارت خرطوم کوتاه چغندر قند روی برگ (اصلی)



شکل ۶- خسارت شدید خرطوم کوتاه چغندرقد در مرحله ابتدایی رشد گیاه (اصلی)

زیست شناسی آفت

زیست شناسی این آفت چغندرقد به شرح زیر است:

- به طور معمول، خرطوم کوتاه به صورت حشره کامل و لارو درون خاک و ریشه های باقی مانده زمستان گذرانی کرده و در بهار با مساعد شدن شرایط آب و هوایی، از پناهگاه زمستانی خارج می شود و از برگ های بوته های نورسته تغذیه می کند.

- باتوجه به اینکه زمان کاشت چغندرقد در بیشتر مناطق استان همدان در نیمه دوم فروردین ماه است، این آفت از اوایل رویش گیاه در دهه اول اردیبهشت ماه ظاهر می شود.

- حشرات کامل در روزهای آفتابی از برگ های جوان تغذیه می کنند و لاروهای زمستان گذران نیز به تدریج تبدیل به شفیره و حشره کامل می شوند؛ به این ترتیب، پیدایش این آفت در مزرعه تدریجی بوده و همه مراحل زیستی آن در مزرعه قابل مشاهده است.

- حشرات کامل هر یک تخم های خود را جداگانه درون بافت برگ های جوان و دمبرگ های چغندرقد قرار می دهند و روی آن ها را با ماده ای می پوشانند

که ابتدا سبز است، اما بعدها، به صورت خال های سیاه دیده می شود. تعداد خال های سیاه روی هر بوته، بنا به تراکم آفت متفاوت است.

- پس از ده روز، تخم ها تفریخ می شوند و لاروها برای مدت کوتاهی، از برگ تغذیه می کنند و سپس وارد خاک می شوند و کنار ریشه چغندر قند لانه می سازند و ضمن تغذیه از ریشه، به رشد و نمو خود ادامه می دهند.


- لاروهای کامل درون خاک، لانه هایی کوزه ای شکل می سازند و وارد مرحله شفیرگی (حدود دو هفته) می شوند.

- حشرات کامل پس از خروج از لانه های شفیرگی به سطح خاک می آیند و تغذیه و تخم گذاری را آغاز می کنند.

- طول دوره زیستی هر نسل از مرحله تخم تا حشره کامل حدود ۸۵ روز است.

- تخم ها برای ایجاد نسل دوم بیشتر روی طوقه و دم برگ ها گذاشته می شوند و لاروهای این نسل نیز از ریشه تغذیه می کنند؛ اما گاهی به سبب بزرگ شدن ریشه ها در این مرحله، خسارت وارد شده روی بوته ها تحمل پذیر است. با وجود این، هر چند گیاه خشک نمی شود، اما بر اثر تغذیه لارو و ایجاد راه نفوذ عوامل بیماری زا از وزن ریشه و میزان قند به مقدار زیادی کاسته می شود و در سیلوهای کارخانه نیز گیاهان بیشتر به عارضه پوسیدگی مبتلا می شوند. با این همه در منابع مختلف، تعداد نسل این آفت را در مناطق سردسیر یک نسل ذکر کرده اند.

***نکته:** طبق بررسی های مقدماتی طی سال های زراعی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، به نظر می رسد که این آفت قادر به ایجاد نسل دوم هم است، اما نسل اول آفت در ایجاد خسارت اهمیت بیشتری دارد (شکل ۷).



شکل ۷- جمعیت بالای آفت روی یک بوته

مدیریت آفت

مدیریت تلفیقی آفات روش‌های زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی را شامل می‌شود. کاربرد این روش‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت مهار جمعیت آفت استوار است. بر اساس تحقیقات انجام شده، همراه با تغییرات شرایط آب و هوایی، عملیات مهار این آفت نیز باید تغییر کند. رعایت تناوب مناسب، آیش زمین، کاشت به هنگام، آبیاری منظم و به موقع و وجین علف‌های هرز میزبان، زمینه فعالیت آفت را کاهش می‌دهد و کاهش جمعیت و خسارت آفت را در پی خواهد داشت. باتوجه به به گرمادوستی و خشکی‌پسندی این آفت، اراضی شنی برای فعالیت آن مناسب‌تر است. کم کردن فاصله آبیاری در زمان تفریخ تخم‌ها و ورود لاروها به درون خاک، باعث مرگ و میر بیشتر در لاروها می‌شود. همچنین شخم عمیق و غرقابی کردن زمین پس از برداشت محصول را در کاهش جمعیت لاروهای زمستان‌گذران موثر می‌دانند. به علاوه، مدیریت زیستی با استفاده از دو گونه نماتد انگل حشرات همراه با تعدادی باکتری‌های همزیست آن‌ها، برای مهار این سرخرطومی، مفید گزارش شده است.

در حال حاضر، اصلی ترین روش مهار این آفت بر پایه استفاده از حشره کش ها است. در منابع، به استفاده از حشره کش های فسفره، کاربامات ها و پیرتروئیدها در اختلاط با ترکیبات فسفره برای مهار آفت اشاره شده است. البته استفاده به هنگام و مناسب از حشره کش ها اهمیت زیادی دارد که می تواند تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی نیز باشد. در حال حاضر، حشره کش های مطرح شده در جدول (۱) برای مهار این آفت استفاده می شوند.

جدول ۱- حشره کش های کاربردی برای مهار آفت چغندر قند

نام حشره کش	میزان مورد استفاده
دلتامترین (دسیس) EC 2.5%	یک لیتر در هکتار
اتریمفوس (اکامت) EC 50%	یک تا یک و نیم لیتر در هکتار
پرمترین EC 25%	نیم تا یک لیتر در هکتار
*سمپاشی در در دو مرحله (دهه اول خردادماه و مرحله ۴-۶ برگی و دهه اول مردادماه و مرحله ۲۰-۲۴ برگی) برای کنترل آفت مورد استفاده قرار می گیرد.	

سرخرطومی ها تغذیه بالایی از این محصول دارند و خسارت بالایی به آن می زنند. کوچک بودن اندازه آفت موجب می شود تا کمتر در معرض آفت کش قرار گیرد؛ به همین سبب، استفاده از آفتکش ها کارایی مناسب ندارد و نیاز به تکرار سم پاشی است. از طرفی، استفاده مکرر از یک حشره کش (یا چند حشره کش با ماده موثره یکسان) امکان ایجاد جمعیت مقاوم را در حشرات بالا می برد. بر این اساس و با توجه به افزایش میزان خسارت این آفت در بیشتر مناطق چغندر کاری کشور، معرفی حشره کش های جدید موثرتر یکی از راهکارهای کاربردی و ضروری در مدیریت آفت است.

***نکته:** لامبدا سای هالوترین حشره کشی تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی از سموم پایرترویدی است که با طیف اثر وسیع و مقدار مصرف پایین، جزو گروه سموم کم خطر ($LD_{50} \leq 56-79 \text{mg/kg}$) با آثار کم آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود و بر دشمنان طبیعی نیز آثار سوء کمی دارد.

خلاصه مطالب

حشرات آفات یکی از چالش های کشت چغندرقد هستند. در سال های اخیر، به سبب تغییرات اقلیمی ایجاد شده به ویژه تغییرات دمایی، روند ظهور و افزایش جمعیت و همچنین خسارت وارده از آفات به محصول متفاوت تر از قبل شده است. از جمله این آفات حشره خرطوم کوتاه چغندرقد است که طی دو سال اخیر در مزارع چغندرکاری استان همدان، خسارت چشمگیری زده است بنابراین، برای جلوگیری از خسارت بیشتر آفت، نیاز به بررسی و معرفی حشره کش های مناسب در آینده نزدیک است. بررسی مقدماتی با حشره کش لامبدا سای هالوترین ده درصد با فرمولاسیون سوسپانسیون کپسولی، با غلظت های ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتر در هکتار در شرایط مزرعه، تاثیری پذیرفتنی روی خرطوم کوتاه چغندرقد نشان داده است.

این حشره کش در غلظت های یادشده، حتی پس از گذشت ۱۵ روز، خاصیت مهارکنندگی به ترتیب ۷۴ و ۸۸ درصدی روی آفت خرطوم کوتاه در مزارع چغندرقد داشته است. این حشره کش قادر است سه روز پس از سم پاشی، ۱/۲ برابر و پس از هفت روز، ۲/۷ برابر بیشتر از حشره کش های رایج (مانند دسیس که فقط هفت روز نخست نتایج راضی کننده ای دارد) اثر مهارکنندگی داشته باشد. حشره کش لامبدا سای هالوترین به سبب وسیع بودن طیف اثر آن، می تواند

باعث کاهش جمعیت آفات مهم دیگر چغندر قند مانند برگ خوار کارادرینا شود که خسارت آنها مقارن با خرطوم کوتاه است.

سم پاشی مزارع چغندر قند در دو مرحله، شامل مرحله ابتدایی رشد (۴ تا ۶ برگگی) و مرحله میانی رشد (۲۰-۲۴ برگگی) گیاه، با آفت کش لامبدا سای هالوترین در غلظت ۲۰۰ میلی لیتر در هکتار توصیه می شود. این شیوه باعث مهار بیش از هفتاد درصد آفت می شود.

یادداشت

به سبب نقش تغییر اقلیم در طغیان برفی از آفات پخندر قند، استفاده از روش‌های مناسب برای مهار فسادات آن‌ها اهمیت می‌یابد.

