



سازمان دامپزشکی
اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

راه های پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد در پرندگان زینتی و خانگی

بیماری

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان یک بیماری قابل انتقال بین انسان و پرندگان می باشد و در مواردی دیده شده که به سایر حیوانات از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم با پرنده آلوده منتقل می گردد. این بیماری به سرعت در بین پرندگان که در یک محل نگهداری میشوند، منتشر شده که به دنبال آن مرگ و میر زیادی نیز ایجاد می کند. (تا ۱۰۰ درصد پرندگان ممکن است تلف شوند).

مخازن بیماری

پرندگان مهاجر و بخصوص اردک های وحشی مخازن طبیع ویروس این بیماری هستند که موجب انتقال بیماری به پرندگان اهلی حساس از جمله مرغ، بوقلمون و سایر پرندگان می شود.

کنترل و پیشگیری

- عدم تماس با پرنده بیمار یا تلف شده
- شستشو و ضدعفونی دست ها، لباس و کفش در صورت تماس با پرنده بیمار
- نصب توری بر روی هواکش و پنجره ها و جلوگیری از ورود پرندگان و سایر حیوانات کوچک به محل نگهداری پرنده ها
- نگهداری (قرنطینه) پرندگان تازه خریداری شده حداقل به مدت ۱۴ روز
- بررسی سابقه محل نگهداری پرنده تازه خریداری شده
- عدم نگهداری پرنده ها در فضای کوچک، با تراکم زیاد و بدون تهویه مناسب
- نصب قفس در ارتفاع حداقل دو متر از سطح زمین و نگهداری پرندگان در دما و تهویه مناسب
- ایجاد حداقل تماس بین فضولات با پرندگان قفس و سایر قفس ها و مواد غذایی
- قرار دادن مواد تقویتی در اختیار پرنده جهت تقویت سیستم ایمنی
- پرهیز از ایجاد هرگونه عوامل استرس زا در محل نگهداری پرنده از جمله رفت و آمد و ...
- استفاده از تستک ضدعفونی در ورودی پرنده فروشی، همچنین ضدعفونی و تمیز کردن ظروف آبخوری، دان خوری و قفس در فواصل کوتاه
- پرهیز از خرید و فروش پرنده بیمار و پرندگان وحشی
- عدم قرار دادن قفس پرندگان در فضای باز و نقل و انتقال پرنده بدون مجوز دامپزشکی
- دفن بهداشتی لاشه پرندگان تلف شده همراه با آهک

