

مدیریت تغذیه پس از خسارت تنش سرما در مزارع غلات دیم

دستورالعمل استفاده از روش محلول پاشی

(باتوجه به امکانات بهره‌بردار از یکی از روش‌های زیر استفاده شود)

۱. **(N. P. K + Zn) + اسید آمینه + اوره**
۲ کیلوگرم در هکتار ۲ لیتر در هکتار ۲ کیلوگرم در هکتار

۲. **اوره + سولفات روی**
۳ کیلوگرم در هکتار ۱/۵ کیلوگرم در هکتار

۳. **اوره + سولفات پتاسیم پودری**
۳ کیلوگرم در هکتار ۳ کیلوگرم در هکتار

احتیاط و هشدارها:

- محلول پاشی عناصر غذایی و اسید آمینه زمانی قابل توصیه است که گیاه در شرایط تنش خشکی شدید نباشد.
- قبل از اختلاط این کودها با سموم یا کارشناسان این حوزه مشورت نمایید.
- برای اثرگذاری بهتر برای هر هکتار از حداقل ۴۰۰ لیتر آب به اضافه ۸۰ سی سی سیتوویت (مایع ظرفشویی) جهت محلول پاشی استفاده شود.
- محلول پاشی در زمان وزش شدید باد و دمای بالای ۲۵ درجه سانتی‌گراد انجام نشود.

مصرف کود سرک:

در مزارعی که در زمان کاشت و داشت کم‌تر از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره مصرف شده و بر اساس پیش‌بینی هواشناسی بیش از ۱۵ میلی‌متر بارندگی خواهد داشت جهت جبران خسارت سرما می‌توان بین ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم اوره در هکتار مصرف کرد.