

مقابله با خسارات سیلاب در دام و طیور

یک نگرانی مهم در طول بلایای طبیعی، اثرات ثانویه ی این بلایاست.

از مهم ترین اثرات ثانویه، افزایش شیوع بیماری ها در حیوانات و همچنین انتقال بیماری های مشترک به انسان ها می باشد.

اقدامات قبل از وقوع سیل:

- ۱- ذخیره علوفه کافی در دامداری ها و دان در مرغداری ها و ...
- ۲- عدم قرار دادن علوفه و دان در مکانی که احتمال نفوذ آب دارد و استفاده از پالت در انبار دان مرغداری
- ۳- آمادگی بهره برداری از ژنراتور برق اضطراری
- ۴- ایجاد سیل بند و مهار آب و جلوگیری از ورود آب به واحد دامداری یا مرغداری یا آبیاری پروری
- ۵- شناسایی واحد های غیر فعال در مناطق امن تر جهت تخلیه اضطراری
- ۶- ارسال طیور سن بالا و دامهای پروار شده به کشتارگاه

مخاطرات متعاقب سیل در دام و طیور به دو دسته تقسیم می گردند:

الف: خطرات غیر عفونی

- ۱- صدمات ناشی از برخورد اجسام سخت با دام ها
- ۲- غرق شدن حیوانات
- ۳- ورود مایعات به مجاری تنفسی که سبب خفگی و عفونت ریوی می گردد.
- ۴- اسهال و استفراغ در اثر آلودگی منابع آبی با فاضلاب ها و مواد شیمیایی سمی

ب: خطرات عفونی

بعد از سیل به دلیل از بین رفتن اکوسیستم طبیعی که به طور معمول پناهگاهی برای عوامل بیماریزا و ناقلین بیماری می باشد، بروز یک سری بیماری گسترش پیدا می کند. این بیماریها شامل:

* سیاه زخم یا شاربین * شاربین علامتی * لپتوسپیروز * لمپی اسکین * کم خونی عفونی اسب * بیماری انگلی ژیاوردیازیس
* پوسیدگی سم * تب برفکی * بوتولیسم * تب سه روزه * آبله * طاعون نشخوار کنندگان کوچک PPR

افزایش تکثیر پشه ها در طول و بعد از جاری شدن سیل سبب افزایش بیماری می گردد.

اقدامات پس از وقوع سیل:

- ۱- برآورد میزان دام های بیمار، صدمه دیده و تلفات و گزارش سریع آنها به اداره دامپزشکی
- ۲- جمع آوری لاشه دام ها از میان گل و لای و حفر گودال جهت دفن بهداشتی دامهای تلف شده و در نهایت ضدعفونی و آهک پاشی
- ۳- تامین آب بهداشتی و خوراک سالم برای دام و طیور
- ۴- همکاری با اکیپ های دامپزشکی و توجه به توصیه های ارائه شده از سوی آنها
- ۵- واکسیناسیون فوری قبل از وقوع بیماری و مرگ و میر با توجه به وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری های منطقه و فصل وقوع آنها طبق توصیه اداره دامپزشکی
- ۶- استفاده از مکمل های درمانی دام برای دامهای باقی مانده
- ۷- استفاده از سموم دامپزشکی برای سمپاشی اماکن دامی
- ۸- استفاده از داروهای ضد انگل داخلی (قرص، شربت،...) جهت افزایش توان سیستم ایمنی بدن دام ها
- ۹- پاشیدن مواد ضدعفونی کننده در معابر روستا و ورودی و محوطه دامداری و مرغداری ها پس از فروکش کردن سیل
- ۱۰- خودداری از جابجایی و نقل و انتقال دامها بدون مجوز از اداره دامپزشکی

اداره آموزش و ترویج

اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان