

مبارزه:

نشریه
تحقیقی ترویجی

وزارت کشاورزی
سازمان کشاورزی استان اصفهان
معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج

شیشک خودی به



۱- این حشره در طبیعت دارای زنبورهای متعدد پارازیت می‌باشد که در بعضی مواقع آنرا بخوبی کنترل می‌کنند.

۲- برای مبارزه شیمیائی علیه این فقط در اواسط خرداد ماه توصیه می‌گردد، زیرا در این موقع است که نوزادهای جوان حشره خارج می‌شوند. برای این منظور از حشره‌کش‌های فسفره مانند آزینفوس متیل به نسبت $2/5$ در هزار استفاده می‌گردد و سمپاشی نیز یک نوبت کافی است.

از انتشارات:

واحد تولید برنامه و انتشارات فنی
مدیریت آموزش و ترویج

۱۳۷۸ زمستان



مقدمه:

طرز زندگی آفت:

شپشک نخودی زمستان را بصورت پوره یا نوزاد سن دور روی شاخه ها بسر می برد. در اوائل بهار پوره ها به شپشک کامل تبدیل شده و حشرات ماده همزمان با گل کردن درختان به، شروع به تخم ریزی می نمایند و در اواسط خرداد تخم ها باز شده و پوره های جوان که طول آنها حدود ۰/۵ میلیمتر است خارج شده و روی شاخه ها و برگها متفرق و مستقر می شوند و در صورتیکه سمپاشی ضرورت داشته باشد بایستی در همین موقع اقدام نمود. این حشره در سال فقط یک نسل دارد.

شپشک نخودی به، علاوه بر درخت به، بعضی از درختان میوه دیگر را نیز می تواند مورد حمله قرار دهد. این آفت روی شاخه ها فعالیت داشته و شیره ای از خود ترشح می نماید که به درخت منظره بدی می دهد. نام علمی این آفت (*Eulecanium coryli*) می باشد.

مشخصات آفت:

حشره سپر قهوه ای و نسبتاً گرد و نخودی شکل دارد که در قسمت کف مسطح و به گیاه چسبیده است. قطر سپر ۴ - ۵/۵ میلیمتر می باشد. تخم های پسوندی، نارنجی رنگ و حدود نیم میلیمتر طول دارند و در زیر هر سپر ۲۰۰ - ۱۶۰۰ عدد گذارده می شود.

