



بهاد در سال بهاد اقتطادی



سازمان جهاد کشاورزی
استان سمنان

آشنایی و پیشگیری از بیماری

تب بر فکی



افزایش ترشح براق و جراحات پستانی



مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

با همکاری

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

زمستان ۱۳۹۰

کنترل و پیشگیری :

بهترین و مهم ترین اصل در کنترل تب بر فکی ، رعایت اصول قرنطینه ای است . عدم خرید دام از بازار دام به قصد نگهداری در گله ، جلوگیری از جابجایی دام از مناطق آلوده به سایر مناطق ، جلوگیری از ورود سایر دامداران به دامداری ، پرهیز از ورود وسائل نقلیه غیر مجاز به دامداری ، حتی المقدور اکیپ های واکسیناسیون قبل از ورود به دامداری لباس ، چکمه و وسائل خود را ضد عفونی نمایند یا از چکمه و لباس مخصوص دامداری استفاده نمایند.

جهت کنترل تب بر فکی در نواحی ای که قبل از بیماری وجود داشته است واکسیناسیون دام ها توصیه می شود.
واکسیناسیون گاو ها هر ۴ ماه یکبار و در مورد گوسفند بصورت سالانه صورت می گیرد.



واکسیناسیون نسب بر فکی

نشانه های پس از مرگ :

از آنجائی که دیواره ای طاول های تب بر فکی بسیار نازک است و به سرعت پاره می شود ، لذا در اکثر مواقع این طاول ها دیده نمی شوند و معمولاً آثار طاول های پاره شده ، بصورت زخم در مخاط دهان ، پاها و پستان دام دیده می شود .

جراحات دهان ، گاهی تا حلق ، مری ، پیش معده وروده ها هم کشیده می شوند و در صورتی که طاول های موجود در پستان های دام ، پاره شوند ، احتمال وقوع ورم پستان وجود دارد . در فرم بد خیم بیماری ، به ویژه در حیوانات جوان ، شاهد خونریزی در سطح قلب ، ضایعات قلبی به شکل نقاط نامنظم خاکستری رنگ و گا هی نواری شکل ، در عضله قلب دیده می شود که اصطلاحاً به آن قلب ببری می گویند.



جراحات دهانی در بیماری تب بر فکی