

با توجه به اینکه در موقعیت فعلی شرایط اقلیمی برای خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات مناسب است و میزبان‌های مهم این آفت انواع هلو و شلیل، آلوچه، ازگیل ژاپنی، سیب، گلابی، خرمالو، انجیرو میوه‌های مرکبات باقیمانده از سال قبل می‌باشد، بنابراین جهت مبارزه به موقع علیه این آفت و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی روی درختان میوه، بخصوص روی میوه‌های نارنگی پیش‌رس و خرمالو کمیته پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های مرکبات توجه باغداران و بهره‌برداران محترم را به نکات مهم ذیل جلب می‌نماید:



- ۱- برداشت سریع میوه‌های نارنج و پرتقال‌های باقیمانده در باغات مرکبات همچنین تسریع در برداشت میوه‌های رسیده درختان میوه هسته‌دار نظیر هلو و شلیل، آلوچه، ازگیل ژاپنی و ... مورد تاکید قرار گیرد.
- ۲- جمع‌آوری و دفن میوه‌های آلوده و مشکوک ریزش یافته در باغات در عمق ۵۰ سانتی متری خاک.
- ۳- افزایش ایستگاه‌های پیش‌آگاهی با نصب تله‌های جلب‌کننده حاوی فرمون یا مایع سراتراپ به تعداد ۱-۲ عدد در هکتار بمنظور شناسایی کانون‌های آلوده.
- ۴- نصب تله‌های جلب‌کننده حاوی مایع سراتراپ و فرمون به منظور شکار انبوه به تعداد ۴۰ الی ۵۰ عدد در هر هکتار.
- ۵- انجام طعمه‌پاشی ۳-۴ هفته قبل از رسیدن میوه در صورتیکه شکار مگس در تله‌های نصب شده بیش از یک عدد در روز باشد. همچنین تاکید می‌گردد طعمه تهیه شده در همان روز مصرف گردد و در صورت بارندگی تکرار گردد.
- ۶- بهتر است که طعمه‌پاشی با استفاده از سمپاشی پشتی تلمبه‌ای بصورت یک ردیف در میان و در قسمت‌های جنوبی و آفتابگیر درخت، صورت گیرد و در صورت نیاز ۷ تا ۱۰ روز بعد تکرار گردد.
- ۷- در پایان تاکید می‌کنیم که از نقل و انتقال میوه‌های آفت‌زده به دیگر مناطق جداً خودداری گردد.