

بسمه تعالی
سازمان جهاد کشاورزی مازندران
قابل توجه باغداران و تولیدکنندگان نهال مرکبات
"آفت مینوز مرکبات"

با عنایت به بازدیدها و بررسیهای میدانی، فعالیت آفت مینوز مرکبات در نهالستانها و برخی از باغات جوان مشاهده گردیده لذا جهت مدیریت مطلوب آفت مذکور کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت مرکبات توجه بهره برداران محترم را به نکات زیر جلب می نماید:

- ۱- مبارزه علیه پروانه مینوز مرکبات بر اساس برنامه مدیریت تلفیقی می باشد لذا استفاده از روشهای مختلف کنترل نظیر مبارزه زراعی، مکانیکی، تغذیه اصولی، آبیاری، بهداشت کف باغ و نهالستان در کاهش خسارت آفت یاد شده مؤثر و توصیه می گردد.
- ۲- مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی جهت اخذ نسخه گیاهپزشکی تاکید می گردد.
- ۳- مبارزه شیمیایی فقط در باغات جوان مرکبات زیر ۴ سال و نهالستانها روی جوانه های نورسته تابستانه توصیه می گردد.
- ۴- تکرار سمپاشی ها منوط به ظهور جوانه های جدید هر ۱۲ الی ۱۵ روز توصیه می گردد لذا در اوج گرما (اوایل مرداد ماه لغایت اواسط شهریور) بدلیل عدم جوانه زنی مناسب درختان، حتی المقدور سعی گردد از سمپاشی ها خودداری گردد.



- ۵- به منظور کاهش مقاومت آفات تناوب در مصرف سموم موثر نظیر کونفیدور (ایمیداکلوپرید) به میزان ۰/۵ ، ورتیمک (آباکتین) به میزان ۰/۴ لیتر در هزار علیه آفت پروانه مینوز مرکبات مورد تاکید می باشد .
- ۶- به منظور حفظ محیط زیست و دشمنان طبیعی آفات تاکید می شود از سموم توصیه شده در نسخه گیاهپزشکی صادره توسط کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی استفاده گردد.
- ۷- سمپاشی در ساعات خنک روز، صبحها قبل از ساعت ۱۰ و بعد از ظهرها از ساعت ۴ به بعد صورت پذیرد.
- ۸- در صورت افزایش درجه حرارت هوا به بیش از ۳۳ درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده همراه با سموم توصیه شده خودداری گردد.
- ۹- تغذیه اصولی با نظر کارشناسان تغذیه جهت تسریع در رشد و استحکام برگها ... و در کاهش خسارت آفت موثر می باشد.
- ۱۰- رعایت نکات ایمنی مانند ماسک، عینک، کلاه، لباس مخصوص سمپاشی، چکمه، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده پس از اتمام کار با آب و صابون الزامی است .

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی - مدیریت حفظ نباتات