

علائم وجود کنه واروا در کندو

از آن جا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثیر می یابد، لذا در سال های اولیه نمی توان آن را به سادگی تشخیص داد و از طرفی درجه افزایش نسل کنه به طور متوسط سالیانه ۱۰ الی ۱۵ عدد است، بعد از سومین سال آلودگی تعداد کنه افزایش یافته و خسارات آن نمایان می شود. علائم وجود کنه در کندو عبارتند از:

۱- اغلب زنبوران کارگر بی قرارند و به سرعت راه رفته و بدون دلیل بال های خود را به هم می زنند، و در صورت استقرار کنه در مفصل بال ها زنبور قدرت پرواز خود را از دست می دهد.

۲- به دلیل تغذیه کنه از خون زنبوران سبب مرگ و میر غیرعادی زنبوران می شوند.

۳- گاهی لارو کنه از حجره خارج شده و به کف کندو می افتد.

۴- زنبوران داخل کندو اغلب ناقص الخلقه و دارای شکل غیرطبیعی هستند.

۵- به علت ضعیف شدن و پایین آمدن قدرت پرواز و جفت گیری زنبوران نر اغلب ملکه

های ناقص و یا جفت گیری نکرده در کندو مشاهده می شود.