

آفت یک نسلی است و زمستان را به صورت شفیره در عمق خاک بستر باغ به سر می برد. حشرات کامل بعد از ریزش گلبرگ های گیلاس در طبیعت ظاهر و با تغذیه از برگ و میوه های نورسته، باعث پارگی برگ ها و ایجاد حالت قلوه کن در میوه می شوند. حشرات ماده با کمک تخم ریز خود، داخل هسته ی برخی از میوه های که مورد تغذیه قرار داده اند، تخم ریزی می کنند. دوران لاروی آفت درون هسته ی میوه های آلوده سپری شده و پس از اتمام تغذیه، لارو هسته را ترک می کند و درون خاک به شفیره تبدیل می شود. گیلاس و آلبالو میزبانان اصلی این آفت هستند. این آفت در اکثر مناطق که ارقام مختلف گیلاس و آلبالو کشت می شوند، از جمله استان های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، البرز، قزوین، آذربایجان های شرقی و غربی و...، گستردگی دارد و خسارت وارد می سازد.



سوسک سرخرطومی گیلاس خسارت آفت روی میوه های نارس گیلاس و در شرف رسیدن

کنترل غیر شیمیایی

شخم پاییزه + یخ آب زمستانه

برای نتیجه گیری مطلوب تر:

- شخم زمستانه در کل سطح باغ، به ویژه زیر سایه انداز درختان انجام شود.
- عملیات شخم به صورت فراگیر در همه ی باغ های منطقه انجام شود.
- یخ آب زمستانه پس از انجام عملیات شخم و در شب های با هوای صاف و بدون ابر و با سرمای کافی انجام شود.