

« آفت سنِ بذر خوار کلزا »

طبق بازدیدهای میدانی کارشناسان از مزارع سویا و شالی حاشیه مزارع کلزای برداشت شده و طبق مشاهدات بعمل آمده جهت جلوگیری و مبارزه با آفت سنِ بذر خوار کلزا رعایت موارد فنی ذیل به کشاورزان عزیز توصیه می گردد:



- ۱- حشره جمع آوری شده از مزارع مورد بازدید و بقایای کلزا، سن بذر خوار کلزا بوده که عموماً پس از برداشت کلزا جمعیت آن در بقایای کلزا افزایش یافته و به مزارع اطراف مهاجرت و در صورت عدم مدیریت ممکن است منجر به ایجاد خسارت روی محصولات دیگر نظیر سویا، برنج ... که در حاشیه مزارع کلزا کشت شده اند گردد .
- ۲- شخم عمیق بمنظور مدفون کردن بقایای کلزا پس از برداشت علاوه بر افزایش ماده آلی خاک در کاهش جمعیت سنِ مزبور نیز مؤثر می باشد.
- ۳- حسب بازدیدهای بعمل آمده در سنوات قبل و سالجاری، تراکم جمعیت آفت مزبور عمدتاً بصورت موضعی (لکه ای) بوده و در حاشیه مزارع بیشتر می باشد .
- ۴- در صورت بالا بودن جمعیت آفت و مشاهده علائم خسارت روی محصولات زراعی، مبارزه شیمیایی با سموم فسفره نظیر دورسبان یا دیازینون ۶۰ درصد با نسبت توصیه شده بصورت کانون کوبی توصیه و تأکید می گردد. حاشیه مزارع کلزای برداشت شده نیز تا عمق ۳ الی ۴ متر سمپاشی شود.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران - مدیریت حفظ نباتات