

هنگام بروز بلایای طبیعی بویژه سیل، استرس شدیدی به دام‌ها وارد می‌شود؛ همچنین ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های مختلف ویروسی، باکتریایی، انگلی، متابولیکی و مسمومیت‌ها، سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند.

از طرفی سیلاب به‌راحتی در طول مسیر خود، عوامل بیماری‌زا را منتقل و مناطق دیگر را آلوده می‌کند. با در نظر داشتن این نکات، بروز بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، دور از انتظار نیست؛ بنابراین باید بعد از فروکش کردن سیل، وضعیت تغذیه‌ی دام‌ها را در محیطی آرام و دور از استرس‌های محیطی، بهبود بخشید و با مراقبت و دقت در وضعیت دام‌ها، در صورت مشاهده‌ی تغییرات مشکوک به بیماری، از دامپزشک کمک گرفت تا نسبت به گزارش بیماری و درمان مناسب آن‌ها اقدام شود.

بهره بردارن محترم! توجه داشته باشید که برای بی اثر یا کم کردن تبعات سیل و حفظ سلامت حیوانات، علاوه بر آنچه گفته شد، رعایت مواردی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده الزامی است.



آموزش و پژوهش

اداره کل دامپزشکی استان لرستان



سازمان دامپزشکی کشور

دام سالم = جامعه سالم

توصیه‌های بهداشتی در ارتباط با زمان وقوع سیل و پس از آن:

در دامداری‌ها

- از چراندن دام در مسیل‌ها خودداری شود.
- از ورود سیلاب به دامداری جلوگیری شود.
- تا حد ممکن دام‌ها در جایگاه مناسب نگهداری شوند.
- علوفه و آب قابل شرب و سالم از قبل تأمین شود.
- در صورت بروز تلفات، دفن بهداشتی و اصولی لاشه‌ها صورت گیرد.
- تلفات دام‌ها به دامپزشکی شهرستان اطلاع داده شود.

در مرغداری‌ها

- از ورود سیلاب به محل پرورش جلوگیری شود.
- دان مصرفی، به اندازه‌ی کافی تأمین شود.
- ژنراتورهای اضطراری، آماده بهره برداری شوند.
- از رسیدن رطوبت به انبار نگهداری دان جلوگیری شود.
- طیور پرورشی دارای سن بالا به کشتارگاه فرستاده شوند.
- از ادامه‌ی پرورش طیوری که سن بالا دارند جلوگیری شود.
- واکسیناسیون طیور علیه نیوکاسل و آنفلوانزا صورت گیرد.
- در صورت بروز تلفات، دفن اصولی و بهداشتی لاشه‌ها انجام شود.

- تلفات دام‌ها به دامپزشکی شهرستان اطلاع داده شود.

توصیه‌های بهداشتی در ارتباط با زمان وقوع سیل و پس از آن:

در مزارع پرورش ماهی

- نسبت به تعمیر و لایروبی استخرهای رسوب‌گیر اقدام شود.
- از موتورهای اضطراری، پمپ‌های هواده و برگشت آب بازدید شود.
- کانال‌های آبیگری و مسیرهای عبور آب بازبینی شوند.
- در سیلاب و گل‌آلودگی منابع آبی، تغذیه‌ی ماهیان قطع شود.
- پس از سیلاب، تغذیه ماهی‌ها با احتیاط و به میزان کم صورت گیرد.
- نسبت به بازدید از صافی‌ها، توری‌ها و لوله‌های آبرسانی، اقدام شود.
- برای کاهش استرس، بسته به گونه‌ی پرورشی، از نمک استفاده شود.
- از ترکیبات بهبود دهنده‌ی کیفیت آب استفاده شود.
- با نظر کارشناسان، از ویتامین‌ها و مواد تقویت کننده‌ی سیستم ایمنی استفاده شود.
- ماهیان تلف شده جمع‌آوری و سوزانده یا دفن بهداشتی شوند.
- عملیات شست‌وشو و ضدعفونی با ترکیبات مناسب صورت گیرد.
- در صورت بروز تلفات، به دامپزشکی شهرستان اطلاع داده شود.

آموزش و پژوهش اداره کل دامپزشکی استان لرستان