

تجربۀ خونریزی دهنده (هموراژیک)
(عفونت بیمارستانی)
گرچه کند (CCHF)



مشاغل در معرض خطر

دامپزشکان، دامپرووران، کارکنان کشتارگاه‌ها،
قصابان کارکنان بیمارستان‌ها، پرستاران، بهیاران...
تکته:

★ لازم است افراد با مشاغل فوق، در هنگام بروز علائم
، پزشک معالج را، از شغل خویش مطلع سازند.
★ در صورت اقدام سریع و تشخیص زود هنگام،
این بیماری قابل درمان می‌باشد.



روابط عمومی


اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان
(زاهدان - انتهای غربی خیابان امام خمینی (ره))

<http://siba.ivo.ir>

تلف: ۱۵۱۲۰۰

Soren
0541-2418756

۶- خودداری از خرید و مصرف گوشت‌های بازرسی
نشده و فاقد مهر بازرسی دامپزشک (کشتار غیر مجاز)



توجه !

به منظور پیشگیری از انتقال بیماری از طریق مصرف
گوشت و فرآورده‌های دامی: اکیدا توصیه می‌گردد
، قبل از خورد کردن، لاشه دام به مدت ۲۴ ساعت و جگر
به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲ درجه (دمای پایین یخچال)
نگهداری و همچنین برای اطمینان بیشتر، حتما از لباس
کار مجزا، دستکش مناسب و عینک، برای خورد لاشه
استفاده شود.

تب هموراژیک (خونریزی دهنده)

کریمه کنگو (CCHF)

بیماری تب کریمه کنگو، یک بیماری خونریزی دهنده ویروسی است که نخستین بار در منطقه کریمه (شوروی سابق) در سال ۱۹۴۴ و سپس در سال ۱۹۵۶ در کنگو گزارش شد و به همین دلیل، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، نام گرفت.

این بیماری در روسیه، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان و ایران به عنوان بیماری بومی شناخته می شود.

مخزن بیماری؛ مهره داران کوچک مانند، انواع موش، جوجه تیغی، سنجاب و خرگوش می باشد و کنه ها بعنوان ناقل و حتی مخزن ویروس شناخته می شود

انسان و حیواناتی مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و شتر مرغ، توسط کنه ها به منظور خونخواری گزیده شده و از این طریق به بیماری مبتلا میشوند.

راههای انتقال بیماری

در انسان از طریق گزش کنه ها، تماس با خون و ترشحات حیوان آلوده و همچنین تماس با افراد بیمار، احتمال آلوده شدن وجود دارد.



بیماری در انسان

دوره کمون (نهفتگی) بیماری در انسان؛ بر حسب انتقال ویروس (گزش کنه و یا تماس با خون، بافت بافت و ترشحات آلوده) از ۱ تا ۱۳ روز متغیر می باشد. علائم بیماری طی سه مرحله قابل مشاهده است و بیماری پس از دوره نهفتگی، با تب ناگهانی و یک سری علائم غیر اختصاصی شامل سرما در بدن سردرد، حساسیت به نور، درد گردن، درد عضلات و مفاصل، تب و لرز و گیجی شروع و در مرحله دوم به طور معمول، علائم گوارشی نظیر تهوع، استفراغ اسهال غیر خونی و درد شکمی ایجاد و در نهایت مرحله سوم یا مرحله خونریزی دهنده که طی روزهای دوم تا پنجم بیماری رخ می دهد، علائمی همچون خونریزی در مخاطات، خونریزی های زیر پوست و در برخی موارد خونریزی از بینی، ملتحمه و گوش هانیز مشاهده می گردد.

بیماری در حیوانات

آلودگی به ویروس تب کریمه کنگو در حیوانات؛ فاقد علائم بالینی بوده و فقط دام آلوده دچار یک تب ملایم و گذرا می شود و در صورتی که حیوان بیمار در هفته اول آلودگی و هنگامی که هنوز



ویروس در خون دام وجود دارد، کشتار شود، خون خونابه، سایر ترشحات و اندام هایی نظیر کبد، می تواند، می تواند برای افرادی که با این حیوان سرو کار دارند مخاطره آمیز باشد.

گفتنی است، بیشتر گونه های پرندگان سبب به بیماری مقاوم بوده ولی در شتر مرغ، این بیماری دیده شده است.

پیشگیری و کنترل بیماری

- ۱- بهسازی و بازسازی دامداری های سنتی و توسعه دامداری ها و کشتارگاه های صنعتی بر اساس استاندارد های بهداشتی
- ۲- کنترل کنه توسط مواد کنه کش (سم پاشی بدن دام و جایگاه) بخصوص در فصل گرما در مجتمع های تولید و نگهداری دام
- ۳- اجرای اقدامات حفاظت فردی در مناطق بومی بیماری و در فضولی که کنه فعال است (از بهار تا پاییز) جهت افرادی که با دام یا سایر حیوانات سرو کار دارند، الزامی می باشد، مثل استفاده از دستکش، لباس های محافظت کننده و....
- ۴- خودداری از تماس با ترشحات و خون دام آلوده
- ۵- خودداری از کشتار دام در کشتارگاه های غیر مجاز