



سازمان دامپزشکی کشور



# آشنایی با بهداشت دام و جایگاه



اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان



جایگاه تمیز و بهداشتی و سالم، نشانه مدیریت خوب و هوشمندانه‌ی دامدار است.

## راه‌های رسیدن به بهداشت دام :

### طراحی دامداری امن و مناسب :

- ❖ دامداری نباید در مسیر رودخانه و مناطق سیل خیز و در مسیر بادهای فصلی ساخته شود.
- ❖ جهت دامداری طوری انتخاب شود که حداکثر نور آفتاب به آن بتابد.
- ❖ به منظور جلوگیری از ورود حیوانات و کنترل آن‌ها ضرورت دارد در اطراف تأسیسات دامداری حصارکشی مناسب و بلند صورت گیرد.
- ❖ ورودی دامداری بایستی حوضچه‌ی ضد عفونی داشته باشد، همیشه از مواد ضد عفونی مناسب و مؤثر پر باشد.
- ❖ محل پرورش دام از منازل مسکونی فاصله داشته باشد.
- ❖ دیوارها تا ارتفاع ۲-۱/۵ متری سیمانی شوند و کف جایگاه بتونی باشد و کانال‌های کم عمقی برای عبور ادرار و ترشحات ایجاد شود.
- ❖ کف جایگاه به صورت دائم خشک نگه داشته شود.
- ❖ کود روزانه جمع آوری و آهک پاشی شود.
- ❖ آب آبشخورها حداقل هفته‌ای یک بار خالی و آبشخور با برس تمیز گردد.
- ❖ عدم تردد به دامداری‌های آلوده و میادین خرید و فروش دام و قرنطینه کردن دام‌های تازه وارد رعایت شود.
- ❖ ضد عفونی ابزار و وسایل و خودروهای حمل دام و علوفه آن‌ها قبل از ورود به دامداری انجام شود.
- ❖ دفن بهداشتی دام‌های تلف شده در محل دامداری یا سوزاندن در کوره‌ی لاشه سوز صورت گیرد.

### تهیه دام و علوفه از محل‌های غیر آلوده :

- ❖ در تهیه و خرید دام بایستی دقت شود چرا که اگر دام از مناطق آلوده به بیماری‌های واگیر خریداری شود دامدار به دست خود بیماری را وارد دامداری و منطقه کرده است. در این مورد بایستی با هماهنگی دامپزشکی محل و با مجوز بهداشتی، دام از محلی که بیماری وجود ندارد تهیه شود.
- ❖ دام خریداری شده بایستی ۲۱ روز در قرنطینه نگهداری شود و توسط دامپزشک معاینات و معالجات لازم و واکسیناسیون مورد نیاز انجام شود، و در صورتی که در این مدت دام نشانه‌ای از بیماری را نشان نداد در کنار سایر دام‌های هم سن قرار گیرد.
- ❖ علوفه و غذای دام بایستی از محلی مناسب، شناخته شده و غیر آلوده، تهیه شود. از خرید علوفه کپک زده و سمپاشی شده خودداری گردد.
- ❖ آب آشامیدنی و مورد مصرف دامداری بایستی از نظر آلودگی و میزان سختی و یا سنگینی، مرتب آزمایش شود تا مناسب آشامیدن باشد.



## رفع آلودگی ها ، شستشو ، ضدعفونی و سمپاشی:

❖ کود، فضولات و ضایعات محیط مناسبی برای رشد عوامل بیماریزا و ماندگار شدن آلودگی هستند. جمع آوری مرتب و منظم و حمل کود و فضولات و تلفات به خارج دامداری سبب جلوگیری از انتقال آلودگی به محیط زندگی دامها می شود.

❖ پس از جمع آوری کود و فضولات بایستی کف و دیواره ها را شست و ضدعفونی کرد ، سم پاشی در فصل بهار و پائیز هر ۱۵ روز و در سایر فصول هر ماه انجام شود. حصارها و اطراف محوطه و دیواره های داخلی و بیرونی اصطبل ها و ساختمان های کارگری و دفتر کار شستشو ، ضدعفونی و سمپاشی شوند. ❖ آخورها و آبخوری ها پس از تخلیه و شستشو فقط ضدعفونی شوند و با توجه به احتمال مسمومیت از سمپاشی خودداری شود.

## جداسازی و نگهداری دامها بر حسب سن و شرایط تولید:

❖ دامها بر حسب سن و شرایط خاص بایستی جداگانه نگهداری شوند .

## واکسیناسیون:

❖ واکسیناسیون بر اساس برنامه سازمان دامپزشکی از مهمترین راههای پیشگیری از بیماری ها است.

## توصیه ها و احتیاط های لازم در واکسیناسیون:

- ❖ واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شود.
- ❖ حداقل ۲ ساعت قبل و یک روز پس از واکسیناسیون ، به دامها استراحت داده و از جابجایی آنها خودداری شود.
- ❖ به هنگام مصرف واکسن، زنجیره سرد رعایت شود.
- ❖ از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.
- ❖ تمامی دام های سالم موجود در گله، بطور همزمان واکسینه شوند.
- ❖ به منظور حفظ یکنواختی، قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن به آرامی هم زده شود.
- ❖ تمام محتوای ویال واکسن در روز واکسیناسیون استفاده و از مصرف باقیمانده آن خودداری شود.
- ❖ ویال های خالی واکسن بطور صحیح ضدعفونی و سپس دفن شوند.

| تقویم سالانه ی واکسیناسیون و مبارزه با انگل های دامی        |                                                      |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | نوع واکسن                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|--------|-------|-----|-------|----------|-------------------------------|
| توضیحات                                                     | اسفند                                                | بهمن | دی  | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت |                               |
|                                                             | ۲ یا ۳ فاز در سال با اعلام سازمان دامپزشکی کشور      |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | تب برفکی (گاو)                |
|                                                             | یک فاز یک مرتبه در سال با اعلام سازمان دامپزشکی کشور |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | تب برفکی (گوسفند)             |
|                                                             |                                                      |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          |                               |
| یک فاز یک مرتبه در نیمه اول سال و لکه گیری در نیمه دوم سال  |                                                      |      |     | ✓✓  |      |     |        |       | ✓✓✓ | ✓✓✓   | ✓✓✓      | آبله                          |
| در میش های غیر آبستن                                        |                                                      |      |     |     |      |     |        | ✓✓✓   | ✓✓✓ | ✓✓✓   | ✓✓✓      | بروسلوز گوسفند بالغ (RD Rev1) |
| بره و بزغاله های ماده بالای ۳ ماه تا یک ماه قبل از جفت گیری |                                                      |      |     |     |      |     | ✓✓✓    | ✓✓✓   | ✓✓✓ |       |          | بروسلوز بره (FD Rev1)         |
| واکسیناسیون کلیه گاو های ماده اعم از آبستن و غیر آبستن      | در طول سال و با توجه به واکسیناسیون قبلی             |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | بروسلوز گاو بالغ (RD IRIBA)   |
| واکسیناسیون گوساله های ماده ۴ تا ۱۲ ماهه                    | در طول سال و با توجه به سن گوساله ها                 |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | بروسلوز گوساله (FD IRIBA)     |
| قبل از تغیر جیره غذایی                                      | ✓                                                    |      |     |     | ✓✓✓  | ✓✓✓ |        |       |     |       | ✓✓✓      | آنترتوکسمی                    |
| واکسیناسیون دو ماه قبل از زایش                              |                                                      |      |     | ✓✓✓ | ✓✓✓  | ✓✓✓ |        |       |     |       |          | آگلاکسی                       |
| همچنین واکسیناسیون در کانون های بیماری                      |                                                      |      |     |     |      |     | ✓✓✓    | ✓✓✓   |     |       |          | قائقاریا                      |
| حد اقل ۲ ماه قبل از فعالیت انگل های خارجی (کته ها)          | ✓                                                    | ✓✓✓  | ✓✓✓ |     |      |     |        |       |     |       |          | تیلریوز                       |
| حداقل سن واکسیناسیون ۱/۵ الی ۲ ماه است                      | در طول سال و با توجه به دریافت واکسن قبلی            |      |     |     |      |     |        |       |     |       |          | هاری                          |
| زمانی که درجه حرارت به ۲۰ درجه سانتیگراد می رسد             |                                                      |      |     |     | ✓✓✓  | ✓✓✓ |        |       |     | ✓✓✓   | ✓✓✓      | مبارزه با انگل های خارجی      |
|                                                             |                                                      |      |     |     |      | ✓✓✓ | ✓✓✓    |       |     |       | ✓✓✓      | مبارزه با انگل های داخلی      |
| حداقل یک بار در فصل پائیز قبل از جایگزینی زمستانه           |                                                      |      |     |     |      | ✓✓✓ | ✓✓✓    |       |     |       | ✓✓✓      | سمپاشی جایگاه                 |

✓✓✓ مناسب ترین زمان واکسیناسیون در طول سال



**اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان**

📍 آدرس: جیروفت، خیابان مدرس تلفن: ۴۳۲۱۹۱۶۰ - ۰۳۴

شماره ۱۵۱۲ سامانه اطلاع رسانی و پاسخگویی

پست الکترونیک: jiroft\_vet@yahoo.com وب سایت: http://jika.ivo.ir