

سیل و مخاطرات ناشی از آن در دام

یک نگرانی مهم در طول بلایای طبیعی، اثرات ثانویه ی این بلااست. از مهم ترین اثرات ثانویه، افزایش شیوع بیماری ها در حیوانات می باشد.

بیماریهای حیوانات متعاقب سیل به دو دسته تقسیم می گردند:

- ۱- مخاطرات غیر عفونی
- ۲- مخاطرات عفونی

خطرات غیر عفونی شامل:

- ۱- غرق شدن حیوانات
- ۲- صدمات ناشی از ضربه
- ۳- پنومونی اسپیراسیون (ورود مایعات به مجاری تنفسی که سبب خفگی و عفونت ریوی می گردد).
- ۴- اسهال و استفراغ در اثر آلودگی منابع آبی با فاضلاب ها و مواد شیمیایی سمی

خطرات عفونی:

بعد از سیل به دلیل از بین رفتن اکوسیستم طبیعی که به طور معمول پناهگاهی برای عوامل بیماریزا و ناقلین بیماری می باشد، بروز یک سری بیماری گسترش پیدا می کند. این بیماریها شامل:

- ۱- سیاه زخم یا شاربن
- ۲- شاربن علامتی
- ۳- لیتوسپیروز
- ۴- بوتولیسم
- ۵- تب سه روزه
- ۶- آکابان
- ۷- کم خونی عفونی اسب
- ۸- بیماری انگلی زیاردیازیس
- ۹- پوسیدگی سم

افزایش تکثیر پشه ها در طول و بعد از جاری شدن سیل سبب افزایش بیماری می گردد.

اقدامات دامپزشکی متعاقب سیل:

- ۱- جمع آوری لاشه دام ها از میان گل و لای و حفر گودال جهت دفن بهداشتی دامهای تلف شده و در نهایت ضدعفونی و آهک پاشی
- ۲- واکسیناسیون فوری خانه به خانه ی دامهای حساس علیه شاربن، شاربن علامتی، آنترتوکسمی و هاری
- ۳- توزیع مکمل های درمانی دام برای دامهای باقی مانده
- ۴- توزیع ضد انگل های خارجی برای سمپاشی اماکن دامی
- ۵- آموزش و آگاه سازی دامداران مستقر در مناطق سیل زده

اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان