

مدیریت بیماریهای گندم (قابل توجه گندمکاران محترم)

بیماری های گندم را می توان از نظر مدیریت مبارزه شیمیایی به دو گروه، بیماری های **برگی** و بیماری های **سنبله** تقسیم نمود. بیماریهای برگي مهم و شایع استان نظیر لکه خرمایی و سپتوریوز برگي و سنبله در بسیاری از مزارع گندم در مرحله رشدی بعد از ظهور خوشه دیده می شود و در کنار آنها بیماری های طوقه و ریشه بیشتر در مناطق مرطوب تر مشاهد می شود.



توصیه ذیل بسیار مهم و باید مورد توجه در زمان دقیق سمپاشی براساس مرحله رشدی گیاه گندم قرار گیرد.

- توصیه می گردد حتی الامکان از سمپاش های جداگانه برای سمپاشی قارچکش ها و علف کش ها استفاده گردد.
- آزنجایی که معمولاً از یک نوع سمپاش برای هر دو منظور استفاده می گردد، باید برای علفکش ها قطرات بزرگ و قارچکش ها قطرات ریزتر بر روی گیاه پاشیده شوند.
- زمان مناسب برای سمپاشی در طول روز صبح تا عصر می باشد سم پاشی در این موقع باعث بهره گیری از شبنم موجود در روی گیاه به عنوان آب اضافی شده احتمال باد بُردگی سم را کاهش می دهد و خطر گیاه سوزی ناشی از تابش آفتاب نیز کمتر می شود.
- در مورد **جو و گندم دوروم**، جهت ایجاد پوشش یکنواخت بر روی سنبله (خوشه) و کنترل بهتر بیماری، حجم محلول سم را بیشتر در نظر بگیرید.
- مناسب ترین زمان مبارزه در گیاه گندم در مرحله رشدی آغاز گلدهی و زمان ظهور نخستین پرچم ها از سنبله است. در این مرحله تأثیر بهتری نسبت به سایر مراحل رشدی دارد.
- مناسب ترین زمان مبارزه در گیاه جو، مرحله رشدی زمان خروج ۵۰ تا ۷۰ درصد سنبله می باشد.
- از یک **مویان** مناسب نظیر **سیتوت** (با دوز نیم در هزار) به همراه قارچکش استفاده نمایید.
- مناسب ترین قارچکش قابل توصیه برای این منظور **التوکمبی** است. اما قارچکش های **فولیکور** و **تیلت** نیز کنترل مناسبی را بدنبال خواهند داشت.
- سمپاشی گندم در زمان یاد شده در مزارعی که تاکنون سمپاشی نشده اند و دارای بیماری های برگ و ساقه می باشند نیز مؤثر خواهد بود.