

کنترل آفات و بیماریهای رایج باغات مرکبات (۲)

باغداران محترم به توصیه های ذیل در خصوص کنترل آفات و بیماریهای رایج باغات مرکبات **نوبت اول** توجه فرمایید:

- ۸- با توجه به مشاهده **آفت پروانه مینوز مرکبات** در برخی باغات جوان و نهالستانها بر اساس برنامه مدیریت تلفیقی با بکارگیری روشهای مختلف مبارزه نظیر مبارزه زراعی، مکانیکی، بهداشت کف باغ و نهالستان، تغذیه اصولی و آبیاری در کاهش خسارت آفت اقدام گردد، مبارزه شیمیایی فقط در باغات جوان مرکبات زیر ۵ سال و نهالستانها روی جوانه های نورسته توصیه می گردد.
- حشره کشهای موثر برای مبارزه شیمیایی بر علیه مینوز مرکبات با رعایت تناوب مصرف کنفیدور به میزان ۰/۵، ورتیمک به میزان ۰/۴ لیتر در هزار لیتر آب توصیه می گردد.
- ۹- نظر به اهمیت حفظ تعادل طبیعی و حمایت از دشمنان طبیعی آفات، کاهش اثرات سوء زیست محیطی سمپاشی با یکی از حشره کش ها و کنه کشهای توصیه شده فقط روی درختان آلوده تاکید می شود لذا از سمپاشی باغات و درختان بدون آفت اجتناب گردد.
- ۱۰- به منظور پیشگیری از بروز مقاومت در حشرات و کنه ها تاکید می گردد از **ترکیب ۲ حشره کش یا کنه کش** هنگام سمپاشی خودداری و تناوب در مصرف سموم از گروههای مختلف رعایت شود.
- ۱۱- توصیه می شود از اختلاط سموم و روغنها با کودهای شیمیایی هنگام سمپاشی اکیداً خودداری گردد.
- ۱۲- قبل از شروع سمپاشی به زنبورداران منطقه جهت انتقال کندوهای زنبور عسل به منطقه امن اطلاع رسانی شود.
- ۱۳- تأکید می گردد به منظور پیشگیری از اثرات سوء تنشهای گرمایی، سمپاشی در ساعات خنک صبحها قبل از ساعت ۱۰ و بعد از ظهرها ساعت ۴ به بعد در هوای بدون وزش باد انجام شود.
- ۱۴- جهت پیشگیری از مسمومیت های احتمالی رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از لباس مخصوص سمپاشی، ماسک، عینک، کلاه، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده بدن بلافاصله پس از اتمام کار با آب و صابون الزامیست.



مدیریت هماهنگی ترویج مازندران

نیر ۹۹