

کنجد:

کنجد گیاهی است گرمادوست و اساساً یک محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بوده و به دمای پایین حساس است اما با اجرای برنامه به نژدای گسترش کشت آن به مناطق معتدل ممکن می باشد. کنجد

دارای پروتئین، ویتامین های B, D, E, F1 و لسیتین (LECITHIN) می باشد. مقدار روغن

آن در حدود ۵۰٪ است. تاریخ کاشت کنجد: تاریخ کاشت این محصول در مناطق گرمسیر مرکزی از اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه می باشد و تا حدودی در این مناطق تا نیمه خرداد ماه قابل کشت می باشد. دلیل توصیه در این تاریخ کاشت عدم برخورد دوره گلدهی به گرمای زیاد می باشد.



کشت دیر هنگام نیز باعث می شود قبل از کامل شدن روزت گیاه (۴ تا ۸ برگی) دچار سرما زدگی شود و باعث سرما زدگی و یا کاهش محسوس عملکرد گردد.



(میزان بذر مصرفی کلزا ۶ کیلو گرم در هکتار می باشد)

برداشت کلزا: برداشت کلزا باید به وسیله کمباین مخصوص به خود یعنی با هد مخصوص برداشت دانه های کلزا باشد تا ریزش دانه های کلزا را به حد اقل ممکن برساند.



کلزا: کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی ۴۰-۴۵ درصد روغن و ۲۵-۳۵ درصد پروتئین می باشد. روغن کلزا بدلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع و درصد پایین اسیدهای چرب اشباع همانند زیتون جزء با کیفیت ترین روغن های خوراکی است. پروتئین موجود در کنجاله نیز در تغذیه دام و طیور استفاده می شود. کشت کلزا در تناوب با گندم و جو علاوه بر مزایایی نظیر کاهش جمعیت علفهای هرز و کاهش آفات و بیماریهای گندم باعث افزایش و پایداری عملکرد دانه گندم می شود.



تاریخ کاشت کلزا:

کلزا از اواسط مهر ماه تا اوایل آبان ماه کشت می شود اگر زود تر از موعد کشت شود ممکن است موجب گلدهی زود هنگام و سرمای زمستانه شود.



سازمان جهاد کشاورزی استان یزد مدیریت جهاد کشاورزی ابرکوه جهاد کشاورزی بخش بهمن



زراعت دانه های روغنی

(کلزا - کنجد - گلرنگ)

کارشناس پهنه: محمد متولی


تیر و مرداد ۱۳۹۶

میوه گلرنگ دارای پروتئین و حدود ۶۰٪ روغن است که اگر به طریقه فشار سرد به دست آید روغن خوبی برای تغذیه است. این روغن حدود ۷٪ اسیدهای چرب اشباع شده، ۲۰٪ اسید اولئیک، ۶۵٪ اسید لینولئیک و ۵٪ اسید لینولنیک دارد.

زمان کاشت گلرنگ: زمان کاشت گلرنگ

بستگی به نوع رقم و منطقه کاشت دارد ولی در این مناطق با اقلیم گرم و خشک و تا حدودی معتدل مناسبترین زمان اسفند ماه (ابتدا تا اواسط اسفند ماه) می باشد. گلرنگ مقاوم به شوری می باشد و می تواند شوری ۷ میلی موس را تحمل کند.

مقدار بذر و فواصل کاشت: برای کاشت این گیاه بین ۳۰ تا ۲۵ کیلو بذر با فواصل کاشت ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و فاصله بین ردیف ۵ سانتی متر.



نیاز های حرارتی و خاکی: این گیاه به نور و حرارت کافی نیاز دارد و همچنین PH خاکی (۷الی ۸) به جهت رشد نیاز دارد که مطابق با شرایط اقلیم و خاک این مناطق می باشد.

گلرنگ: بعضی از استان های جنوبی گل خشت

نیز نامیده می شود و بومی ایران است و در حال حاضر در بیشتر نقاط دنیا کشت می شود. گیاهی است یکساله که ارتفاع آن به حدود ۶۰ سانتیمتر می رسد. برگ های آن پهن، دندانه دار و بدون دمبرگ می باشد. رگبرگ ها در قسمت زیرین برگ کاملاً نمایان است. گل های آن منفرد، لوله ای و به رنگ زرد مایل به قرمز است که در انتهای ساقه ظاهر می شود. میوه آن سفید و به صورت فندقه بوده که انت هائی آن دارای دسته ای تار نازک است

